

# Meloxifin 0,2% Solución Inyectable

Uso Veterinario

## Antiinflamatorio no esteroide.

### Fórmula:

Cada 100 mL contienen:

Meloxicam ..... 0,20 g

Excipientes c.s.p. .... 100,00 mL

### Indicaciones:

**Meloxifin 0,2%** es indicado para perros en la reducción del dolor y de la inflamación en transtornos musculoesqueléticos agudos y crónicos.

### Generalidades:

**Meloxifin 0,2%** es un antiinflamatorio no esteroide con actividad inhibitora selectiva de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), que confiere un doble beneficio terapéutico, resultando en excelente actividad antiinflamatoria, analgésica y antiexudativa con mínimos efectos gastrolesivos o ulcerogénicos. Además de esos efectos, Meloxicam inhibe también la infiltración de leucocitos en el tejido

inflamado y previene la destrucción ósea y cartilaginosa que ocurre en los procesos de inflamación degenerativa del sistema locomotor.

**Meloxifin 0,2%** es indicado en procesos inflamatorios de perros, tales como:

- Patologías dolorosas o degenerativas, agudas o crónicas, del sistema osteomioarticular: osteítis, artritis, artritis reumatoide, osteoartritis, espondilosis, espondiloartrosis anquilosante, displasia coxofemoral, calcificación de discos intervertebrales, reparación de fracturas, traumatismos y postoperatorio de artroplastias.
- Afecciones oculares: uveítis, conjuntivitis, postoperatorios.
- Trastornos de orden reproductivo como retención de placenta.
- Metritis y mastitis.
- Analgesia pre y postoperatoria.

### Modo de Uso y Dosificación:

Dosificación para Perros

Primer día de tratamiento	1,0 mL para cada 10 kg de peso corporal (0,2 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)
Segundo día de tratamiento en adelante	0,5 mL para cada 10 kg de peso corporal (0,1 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)

**Meloxifin 0,2%** debe ser administrado una vez al día, o cada 24 horas por las vías subcutánea, intramuscular o intravenosa.

### Duración del tratamiento:

La duración del tratamiento deberá ser estipulada de acuerdo con la gravedad

del cuadro clínico y tipo de afección a ser tratada. Se recomienda hasta dos aplicaciones consecutivas. En las patologías crónicas de los perros pueden ser necesarios tratamientos prolongados por un período de hasta 28 días o a criterio del médico veterinario.

### Interacciones medicamentosas:

No administrar juntamente con otros antiinflamatorios esteroides o no esteroides o tras el uso de esas drogas. Se recomienda un período de 24 horas de intervalo entre un tratamiento y otro, o de acuerdo con la farmacocinética de la droga anteriormente utilizada.

No administrar juntamente con antibióticos del grupo de los aminoglucósidos (estreptomina, neomicina, gentamicina y kanamicina).

No administrar juntamente con agentes anticoagulantes como la warfarina y la aspirina.

### Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No administrar en animales con disturbios cardíacos, hepáticos o renales severos. No administrar en animales con posible ulceración gastrointestinal o que presenten evidencia de desórdenes hemorrágicos o hipersensibilidad al producto.

Evitar la administración en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos en razón del riesgo de toxicidad renal ser potencializado.

La seguridad del medicamento no fue establecida en perras preñadas.

### Precauciones:

Obedecer la dosificación y vías de administración indicadas para el uso del producto utilizando normas de asepsia propias para aplicación parenteral.

El tratamiento de animales ancianos o con menos de 06 semanas de edad debe ser cuidadosamente acompañado por el médico veterinario, y en algunos casos puede ser necesaria la reducción de la dosis a ser administrada.

### Reacciones adversas:

Pueden ocurrir reacciones generales como disminución del apetito, vómito, diarrea,

melena y apatía. Estas reacciones son generalmente transitorias y tienden a desaparecer con la interrupción o fin del tratamiento.

### Informaciones para uso médico:

El Meloxicam es un antiinflamatorio no esteroide de la familia de los oxicanos y no posee antidoto específico. En caso de intoxicaciones, realizar tratamiento sintomático.

**Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de los niños y de las mascotas.**

**Consulte al médico veterinario. Su venta requiere receta del médico veterinario.**

Las informaciones contenidas en este inserto son soportadas por estudios realizados con el producto y descripciones de literaturas referenciadas abajo: CAULEKETT ET AL., 2003; NARITA, 2006; PLUMB, 2002; SPINOSA, 2005; SPINOSA ET AL., 2008; USP, 2004; WALLACE, 2003.

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni CRMV/SP  
24.508

**Importado y distribuido por:**

**Colombia:** Reg. 9867-MV - Ouro Fino Colombia S.A.S. - Calle 4 Sur 43 a 195  
Oficina 222 Bloque B - Medellín, Colombia  
- Tel.: (57) 4 366-1429

**Elaborado por:**

Ourofino Saúde Animal Ltda.  
Rod. Anhanguera SP 330, km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
Tel/Fax: 55 16 3518 2025  
www.ourofinaodeanimal.com  
Hecho en Brasil

